

Aspekt	Subgruppe	Anzahl der Studien (Anzahl Teilnehmer)	Effektstärke	95 % - Konfidenzintervall	P-Wert
Insgesamt		15 (278)	0,94	0,64-1,24	
Anzahl der Gruppen, Untersuchungszeitpunkt	2-Gruppen-Posttest	3 (52)	1,18	0,58-1,79	
	2-Gruppen Prä-Ppst	6 (151)	0,76	0,3-1,22	
	1-Gruppe Prä-Post	6 (75)	1,09	0,64-1,54	
Gruppenzuordnung	randomisiert	8 (171)	0,68	0,36-1,01	0,004
	nicht randomisiert	1 (32)	1,62	1,07-2,17	
Teilnehmer	Medizinstudierende	6 (109)	1,2	0,44-1,95	
	Ärzte in Weiterbildung	11 (212)	1,03	0,71-1,35	
	Praktizierende Ärzte	1 (18)	1,37	0,65-2,08	
	Andere	1 (14)	1,79	0,45-3,12	
Kognitive Interaktivität	Hoch	13 (258)	0,9	0,6-1,2	0,52
	Niedrig	2 (20)	1,59	-0,51-3,69	
Feedback	Hoch	2 (25)	0,98	0,43-1,53	0,9
	Niedrig	13 (253)	0,94	0,61-1,27	
Wiederholungen	Viele > 10	12 (225)	0,81	0,51-1,1	0,01
	Wenige ≤ 9	3 (53)	1,56	1,09-2,03	
Lernzeit	≥ 5 Stunden	5 (129)	1,11	0,56-1,67	0,64
	< 5 Stunden	9 (130)	0,96	0,65-1,27	

Prüfung	Verblindet	12 (221)	1,05	0,73-1,37	0,28
	Nicht verblindet	3 (57)	0,61	-0,13-1,34	
NOS	Hoch ≥ 4	6 (144)	0,56	0,26-0,86	0,003
	Niedrig <4	9 (134)	1,25	0,89-1,6	
MERSQI	Hoch ≥ 12	12 (240)	1,03	0,65-1,4	0,36
	Niedrig < 12	3 (38)	0,77	0,36-1,18	
Abschätzung der Effektstärke	Präzise	13 (245)	0,94	0,6-1,28	